

Вакцинация во время беременности.

Для небеременных пациенток на прегравидарном этапе действуют следующие правила вакцинации:

- Ревакцинация от дифтерии и столбняка проводится каждые 10 лет. При подготовке к планируемой беременности вакцинацию от дифтерии и столбняка следует проводить не менее, чем за 1 месяц до её наступления.
- Вакцинация от гепатита В проводится трехкратно по схеме 0-1-6 месяцев. При подготовке к планируемой беременности вакцинацию от гепатита В следует начинать не позднее, чем за 7 месяцев до её наступления.
- Вакцинация от краснухи проводится женщинам, ранее не привитым или привитым однократно и не болевшим. При подготовке к планируемой беременности вакцинацию от краснухи следует провести не позднее, чем за 2 месяца до планируемой беременности.
- Вакцинация от кори проводится женщинам ≤ 35 лет (женщинам некоторых профессий в возрасте ≤ 55 лет), ранее не привитым, привитым однократно и не болевшим. Применение комбинированной вакцины для профилактики кори, краснухи и паротита** у женщин требует предохранения от беременности в течение 1 месяца после введения вакцины.
- Вакцинация от ветряной оспы проводится женщинам ранее не привитым и не болевшим. При подготовке к планируемой беременности вакцинацию от ветряной оспы следует провести не позднее, чем за 3 месяца до планируемой беременности.
- Вакцинация от COVID-19 проводится пациенткам, планирующим беременность (на прегравидарном этапе) вакцинами для профилактики COVID-19** с актуальным антигенным составом согласно инструкциям к лекарственным препаратам.
- Рекомендована в сезон гриппа вакцинация вакцинами для профилактики гриппа пациенткам, планирующим беременность (на прегравидарном этапе за 1 месяц до планируемой беременности)

Для беременных пациенток

| Заболевание, от которого производится вакцинация | Вакцинация во время беременности | комментарий |
|--|--|---|
| ГРИПП | В сезон гриппа во 2-3триместре, в группе высокого риска – с 1-го триместра | Трех-четырёхвалентные инактивированные вакцины |
| COVID-19 | Срок беременности согласно инструкции к вакцине | вакцины для профилактики COVID-19** согласно инструкции к вакцине |

| | | |
|----------------------------|-----|---|
| Краснуха | НЕТ | Беременность должна планироваться не ранее, чем через 2 месяца после вакцинации |
| Ветряная оспа | НЕТ | Беременность должна планироваться не ранее, чем через 3 месяца после вакцинации |
| Желтая лихорадка | НЕТ | Только по эпидемиологическим показаниям |
| Гепатит А | ДА | Только в случае высокого риска инфицирования |
| Гепатит В | ДА | Только в случае высокого риска инфицирования. Вакцины, не содержащие консервантов |
| Менингококковая инфекция | ДА | Только в случае высокого риска инфицирования |
| Пневмококковая инфекция | ДА | Только в случае высокого риска инфицирования |
| Полиомиелит | ДА | Только в случае высокого риска инфицирования |
| Бешенство | ДА | Лечебно-профилактическая иммунизация |
| Клещевой энцефалит | ДА | Только в случае высокого риска инфицирования |
| Дифтерия, столбняк, коклюш | ДА | В случае высокого риска инфицирования |

ЖИВАЯ ВАКЦИНА ПРОТИВОПОКАЗАНА ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ!

Специфическая антенатальная профилактика резус-изоиммунизации

- Беременной резус-отрицательной пациентке с отрицательным уровнем антирезусных антител в 28 недель назначается введение иммуноглобулина человека антирезус Rho[D] в 28-30 недель беременности в дозе, согласно инструкции к препарату, внутримышечно.